

口腔牙科患者知情同意书 **加泰罗尼亚官方牙医协会**

作为患者，您有权了解自己所选择的治疗方法的优点和治疗过程中所涉及产生的相关风险。为了确保您能更好地了解治疗方案和过程，以达到治疗的预期效果，在接受治疗前请您认真仔细地阅读以下相关知情内容，并根据自身情况作出决定。

牙医有责任向您提供信息并征求您的同意：

责任人* _____

患者：

年龄：

地址： _____

城市： _____

NIF/NIE/护照号码 _____

为了能顺利实施患者选择的治疗方案，医疗专业人员将告知您可能需要做以下所例出的相关治疗，患者需对此进行阅读、理解并做出评估：

- 简单拔牙 颗牙
- 复杂性拔牙 颗牙
- 外科手术拔牙 颗牙
- 根尖周手术..... 颗牙
- 手术 个良性肿瘤
- 牙髓治疗 颗牙
- 补牙 颗牙
- 口腔义齿安置
- 牙周治疗
- 矫正治疗
- 植牙治疗
- 其他的口腔牙科治疗
- 牙齿美容

治疗开始前患者作出的声明

患者宣称，已经清晰地获知并了解了所有相关的简洁解释。所有的提问和疑问都已得到圆满解答，患者完全了解自己选择的治疗方案的实施方法和存在的可能性风险。该诊所和相关医务工作人员也向我提供了其他的可能性方案。

同意书，签字地点.....，年.....月.....日

患者或法定监护人或法定托管人：

专业人员

女士/先生

医师

牙医协会编号

Les Escoles 牙医诊所专业人员

专业人员通过清晰、明朗的词语向患者提供了以下信息：

局部麻醉：

- 在口腔里注射可引起神经传导可逆性阻断的液体。
- 患者会意识到麻木感，但在两至三个小时后会自动消失，在此期间需特别注意不要咬到麻醉的区域。在口腔内部还未完全恢复敏感前，请避免咀嚼而引起口腔黏膜损伤。
- 个别情况：局部麻醉可引起麻醉区域口腔溃疡、注射区域疼痛、由于肌肉收缩造成的开口局限性，偶尔还可能引起需要进一步治疗的短期性病征。
- 可能引发的病征有血压变动，偶尔还会出现昏厥或后果严重的心室纤维性颤动。
- 还可能引起荨麻疹或其他不可预测、需要紧急治疗的过敏反应。
- 麻醉剂中含有的血管收缩剂成分偶尔也会在心脏有损的患者身上引发需紧急治疗的心脏病。

拔牙：

- 患者了解/不了解使用其他保守治疗避免拔牙的可能性。
- 需临床使用局部麻醉。
- 拔牙前后，即使没有出现并发症，也可能需要采用处方治疗。
- 拔牙后，该区域可能会出现出血、感染或炎症，需进行进一步的治疗。
- 不常见的症状有：拔出的牙齿旁边的假牙受损、邻近区域或舌头上出现口腔黏膜病变、剩余神经根插入上颌窦或与此连通的地方、间骨、外部表或上颌结节骨折或下颌关节脱位，这些并发症并不因手术方案而引起，而是取决于手术本身。
- 极个别情况下，会影响到该区域的神经，在一段时间内敏感度降低，但大多数情况下都可完全恢复正常。
- 抽烟会对伤口愈合过程产生影响并导致恶化。

复杂性及外科手术拔牙：

- 简单拔牙中出现的风险在复杂性拔牙中会增加其频率及强度，因此需要服用药物。
- 下智齿拔取过程中，通常会出现口腔开启局限性以及影响到相应神经，但是并不总是与拔牙的复杂性有关。

根尖周手术：

- 该手术是为了消除某颗牙齿根部的炎症，该炎症可能是对其他治疗无反应或无法使用其他疗法消除的一种症状。
- 作为手术，即使没有并发症，也可能需要术前或术后的处方治疗。
- 手术在麻醉下进行。
- 可引起炎症、口腔黏膜或舌头损伤和疼痛，此时则需要进一步的治疗。
- 偶尔会影响到上颌窦或手术附近区域神经损伤，大部分情况下都可痊愈。
- 个别情况：手术虽然成功，但并没有取得完全的效果，有可能导致复发。

良性肿瘤手术：

- 有必要清除表面疑似良性的肿瘤，以避免进一步恶化。
- 这是最适用的治疗方法。
- 手术在麻醉下进行。
- 切除的肿瘤会由专家进行分析并确诊是否为良性或恶性，或是否有需要进行进一步治疗。患者会收到一份报告的复印件。
- 手术期间或手术后，有可能会影响到周围组织，清除这些区域是一种安全措施，或者在此重建修复。
- 有可能造成炎症、口腔或舌头疼痛。
- 偶尔会造成邻近区域神经结构的短期或永久性损伤、上颌窦感觉障碍或鼻窦炎，都需由专家进行进一步的治疗。

患者或法定监护人或法定托管人签名及日期.....

牙髓病治疗：

- 牙髓治疗是保留牙齿最合适的疗法。这是一种清除发炎或感染的牙髓组织或对肉芽肿或囊肿过程的治疗，并使用防止传染性细菌和病毒感染的密封性材料对牙髓腔及根管进行填充。
- 牙髓病治疗后可能会在咬牙时出现疼痛或感觉到治疗过的牙齿特别突出。该症状一般来说在短时间内会自己消失的。
- 也有可能治疗方案和操作过程完全正确，但是没有取得预期疗效。在这种情况下可能需要再次进行治疗或进行根尖周手术。
- 有可能牙髓有问题的牙齿的颜色会变深。
- 牙髓有问题的牙齿容易碎裂，这是因为健康的牙结构较小，从而整个牙齿更为脆弱。医师有可能会建议放置全部或部分覆盖的牙套或牙冠。
- 极个别情况下，可能会出现仪器在管道内破裂而需吸出，因此可能需要进行相应的手术处理。
-

补牙：

- 补牙指的是在清除龋齿组织后使用一种口腔材质对剩余组织进行密封性处理。这样，可以保留牙齿，使其重新恢复功能，在某种程度上保留其美观。
- 比较常见的是，补过的牙齿在短期内会比较敏感，可能需要造访医师对其进行调整。
- 即使补牙过程进行得很好，之后牙髓还是可能出现病变。龋齿可能会造成牙齿神经的变化，从而需要进行牙髓治疗。
- 龋齿较大或较深的情况下，健康的牙组织较少，需要放置整个或部分的牙套或牙冠对其进行保护，以防止进一步恶化。

口腔义齿放置：

- 口腔义齿的作用是替代部分或全部掉落的牙齿，或者是对失去的牙结构进行解剖重建。
- 任何一种口腔义齿的使用都需要一段适应期和后期的调整。
- 支撑在旁边牙齿上的固定义齿需要进行切割。这一切割可能对神经造成影响，从而导致敏感度发生变化。在最坏的情况下可能需要进行牙髓治疗。
- 固定义齿可能会增加邻近牙齿龋齿的可能性，特别是那些带有轴承保护架的义齿，因此需要更注重口腔清洁。当没有调整好时，可能造成装有挂钩的义齿的异常磨损。
- 全口义齿可能因为压力而造成小溃疡，需要进行调整，通常下颌更为常见。上颌假牙会引起恶心，但适应后即会消失。
- 如果骨头支撑较少的话，义齿可能会不够稳定。唯一的解决方法是进行植牙。

牙周病：

- 其目的是去除牙齿支撑组织中存在的刺激和感染因素，从而保留牙齿、维持其功能和美观，避免牙齿活动、牙骨和牙齿的损失。
- 疗程结束后，通常牙齿会变得比较敏感，易动，有疼痛感以及临时的炎症，需要适当地进行药物治疗。
- 通常特别是在牙周手术后在该区域甚至是脸部会出现炎症，上颌和舌部出现并发症，需要适当地进行药物治疗。
- 跟任何愈合过程一样，需要保持良好的口腔卫生，治疗成功与否取决于患者是否严格按照医师的要求而保持好口腔卫生。
- 由于牙龈萎缩，治疗成功后牙齿表面看来似乎伸长了。
- 治疗成功与否在于适当的保养。每4到6周或根据医师指示需进行复检。
- 抽烟对诊断治疗不利。
- 尽管不常见，但确实存在进展不理想的情况。

患者或法定监护人或法定托管人签名及日期.....

矫正治疗:

- 矫正治疗的目的是对牙齿的位置进行纠正，以获得正确而美观的功能。根据医师标准，将固定或活动的设备放置在口中。
- 为进行正确的治疗，需要先进行正确的诊断，因此医师需要进行额外的检查。
- 有时为进行适当的治疗可能需要拔除一些健康的牙齿，这根据医师的标准进行。拔牙会按照正确的诊断来进行。
- 矫正治疗很明显时间较长，而由于设备在口中放置可造成牙龈炎或龋齿等问题，因此需要特别重视口腔卫生。如果出现龋齿或牙龈问题，其处理及治疗不包括在矫正治疗中。
- 治疗时间各不相同，取决的因素也很多，如医师技术、生物因素或身体自身反应等等。
- 重要的是必须如约前往做所有的治疗期间的检查。不前往做治疗检查会造成治疗的延期和可能性的并发症。
- 口腔中放置设备需要一定时间的适应期，会出现不适、溃疡或黏膜病变。
- 偶尔可能会出现牙齿根部移动和牙龈病变，需要进一步治疗。
- 活动牙箍可能会遗失或被偷。新的牙箍费用由患者自理。
- 治疗期结束后，需要进行适当的跟踪，以避免预期效果外的牙齿的移动。需要按照医师的标准进行复检。不前往复检或没有佩带维护设备的话，医师将无法保证其预期效果。

植牙:

- 植牙指的是在颌骨内放置非生物的通常为金属的结构物，以支撑义齿或固定的牙齿。植牙的类型、方法及之后的义齿取决于进行该项治疗的医师。
- 如果涉及到一位以上的医师，则每个医师都对其进行的部分负其责任。
- 手术将在麻醉下进行。
- 为进行正确的诊断，医师将会要求患者进行适当的补充性检验。
- 植入手术和之后的义齿一样，都必须执行严格的医学标准，并在没有任何禁忌症的情况下才可进行。
- 术后可能会在口腔内或脸部会出现炎症，牙龈或舌根有疼痛感，或者影响到上颌窦，出现鼻窦炎或鼻腔炎，需由专家进行治疗。
- 在少数情况下可能会影响到神经或附近的神经末梢，根据程度轻重在嘴唇、下巴、舌头或牙龈处出现敏感度降低，一般都是暂时性情况，但偶尔会变成永久性症状。
- 也可能影响到邻近的牙根。
- 手术失败率在5-10%之间，会出现的情况是植入部件或假体支撑的损坏。这种情况下需要重复手术。在某些特殊情况下，植入件的放置或取出可能造成颌骨的损坏。
- 必须进行长期的跟踪治疗，并且严格遵守医师建议的口腔卫生要求。不定期复检可能会造成将来出现并发症，这种情况主治医师将不负其责任。
- 可能会出现义齿损坏需要修补或替代的情况。
- 抽烟的习惯对诊断治疗不利。

患者或法定监护人或法定托管人签名及日期.....

口腔、面部和颈部肿瘤手术

- 影响脸部不同结构（口部、鼻子、鼻腔、鼻窦或眼眶）的肿瘤分为良性或恶性两种。良性肿瘤可能会造成局部侵入，但是不会转移到颈部淋巴结或身体其他器官，恶性肿瘤则会。
- 手术是良性肿瘤常见的治疗方式。不同情况下，手术可能会影响到邻近区域的结构，清除这些区域是一种安全手段，或者是在此重建手术的缺陷。
- 恶性肿瘤的治疗方法有三种，经常配合使用，它们是：手术、放疗和化疗。
- 恶性肿瘤的手术是切除作为安全手段包括大部分健康组织在内的患部。此外有时作为预防或治疗手段，还需要清洁颈部淋巴结。这样，单独或与这些治疗手段结合可获得较高的治愈率。
- 为重塑切除的组织：皮肤、黏膜、肌肉、神经、骨头等，需要使用复杂的重塑技术，有时还需要用到微创手术，并使用患者自己、人体组织库或人工组织进行移植，可造成美学和/或功能上的变化以及感官的全部或部分的丧失。
- 因此，这是一项长久而复杂的手术，一般情况下需实施全身麻醉。手术中可能包括的方案一般为临时性的气管切开术、输血和血液制品（可能造成副作用或特定的感染），术后立即进行重症监护病房，营养液插管等设备直到患者可自行进食为止。有时需要进行一些迟发性重建的后期手术，为纠正后遗症或治疗肿瘤的复发。
- 头部和颈部的恶性肿瘤治疗可能会出现并发症，如感染、出血、大出血、移植排斥和/或丢失、呼吸道和/或心脏并发症，甚至可能会造成死亡。除了肿瘤切除可能造成的后遗症外，还取决于它所在的位置。
- 大部分情况下，手术需要全身麻醉，也包含其固有的风险在内。

我理解：治疗结束后，我必须严格遵守医嘱所制定和规定的维护口腔卫生的要求，为确保及时发现任何意外情况，须定期就诊牙医，以最好的诊断治疗任何可能出现的并发症。

- 我已收到自己的外科手术术后说明
- 我已收到义齿的使用和保护说明

我具有一份本同意书的复印件

患者或法定监护人或法定托管人签名及日期.....

当患者不同意签署本同意书

见证人签名

NIF/NIE/护照号.....